



LBM MULTISITE
ANA-L
 9 BD DE VERDUN
 94120 FONTENAY
 SOUS BOIS

**Préconisation pour le patient : Recueil
 d'urine pour Frottis**

CO-PREP-ENR-027-07
 Version 7
 Applicable le : 27-12-2018



ENREGISTREMENT

Préconisation pour le patient :
**RECUEIL D'URINE POUR :
 - FROTTIS URINAIRE**

CO-PREP-ENR-027
 version 07
 Date d'application
 27/12/2018

Pourquoi fait-on ces examens ?

- Le frottis urinaire est un examen qui consiste à rechercher des cellules anormales dans les urines.

Quel matériel est nécessaire ?

Le laboratoire met à votre disposition des pots stériles à bouchon rouge (pot à copro 125 ml) réservés à ce type de prélèvement.

A quel moment faire le recueil ?

Recueillir les urines **de la 2eme miction, de préférence après un effort physique modéré** (marche à pied, montée d'escalier, etc.) après avoir fait une toilette intime

La 1ere miction et les urines de 24 heures sont à proscrire (les cellules sont altérées et gênent l'interprétation)

Comment faire le recueil d'urine ?

Uriner dans le flacon stérile fourni par le laboratoire (pot rempli au ¾ minimum) et le refermer soigneusement.

Attention: si le pot est insuffisamment rempli, le prélèvement sera refusé

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (2 à 3 heures)

Note : le flacon sera identifié par vos soins au laboratoire, à l'aide des étiquettes fournies après création du dossier informatique.



ENREGISTREMENT

Préconisation pour le patient :
**RECUEIL D'URINE POUR :
 - FROTTIS URINAIRE**

CO-PREP-ENR-027
 version 07
 Date d'application
 27/12/2018

Pourquoi fait-on ces examens ?

- Le frottis urinaire est un examen qui consiste à rechercher des cellules anormales dans les urines.

Quel matériel est nécessaire ?

Le laboratoire met à votre disposition des pots stériles à bouchon rouge (pot à copro 125 ml) réservés à ce type de prélèvement.

A quel moment faire le recueil ?

Recueillir les urines **de la 2eme miction, de préférence après un effort physique modéré** (marche à pied, montée d'escalier, etc.) après avoir fait une toilette intime

La 1ere miction et les urines de 24 heures sont à proscrire (les cellules sont altérées et gênent l'interprétation)

Comment faire le recueil d'urine ?

Uriner dans le flacon stérile fourni par le laboratoire (pot rempli au ¾ minimum) et le refermer soigneusement.

Attention: si le pot est insuffisamment rempli, le prélèvement sera refusé

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (2 à 3 heures)

Note : le flacon sera identifié par vos soins au laboratoire, à l'aide des étiquettes fournies après création du dossier informatique.