



ENREGISTREMENT

Préconisation pour le patient :
Recueil des selles pour recherche de
sang

CO-PREP-ENR-020
version 06
Date d'application
24/02/2020

Pourquoi fait-on cet examen ?

Il s'agit d'un test de dépistage détectant la présence de sang dans les selles pouvant être en rapport avec un cancer du côlon, les ulcères, les polypes, la colite, diverticulite, et les fissures (liste non exhaustive)

Quel matériel est nécessaire ?

Le laboratoire met à disposition des pots stériles à bouchon rouge destinés à cet examen. Il s'effectue sur 3 jours (1 recueil de selles par jour) donc 3 pots.

Comment faire le recueil de selles ?

- A réaliser à distance (au moins 3 jours) d'épisodes de saignement type menstruation, hémorroïde, sang dans les urines. (risque de faux positif)
- L'alcool, l'aspirine et certains médicaments pris en excès peuvent provoquer une irritation gastro-intestinale provoquant un saignement occulte. Ces substances doivent être arrêtées au moins 48 heures avant le test.
- Aucune restriction alimentaire n'est nécessaire

- ✓ Recueillir les selles dans le pot.
- ✓ Au minimum, un volume correspondant à **une grosses noix de selles** est nécessaire.
- ✓ **Après recueil de chaque selle**, le patient doit rapporter le jour même rapidement dans les 2 heures à température ambiante le pot au laboratoire pour que celui-ci soit traité dans les plus brefs délais ou **dans les 12 heures** si conservée au **réfrigérateur**.

Note : le flacon sera identifié par vos soins au laboratoire, à l'aide des étiquettes fournies après création du dossier informatique.



ENREGISTREMENT

Préconisation pour le patient :
Recueil des selles pour recherche de
sang

CO-PREP-ENR-020
version 06
Date d'application
24/02/2020

Pourquoi fait-on cet examen ?

Il s'agit d'un test de dépistage détectant la présence de sang dans les selles pouvant être en rapport avec un cancer du côlon, les ulcères, les polypes, la colite, diverticulite, et les fissures (liste non exhaustive)

Quel matériel est nécessaire ?

Le laboratoire met à disposition des pots stériles à bouchon rouge destinés à cet examen. Il s'effectue sur 3 jours (1 recueil de selles par jour) donc 3 pots.

Comment faire le recueil de selles ?

- A réaliser à distance (au moins 3 jours) d'épisodes de saignement type menstruation, hémorroïde, sang dans les urines. (risque de faux positif)
- L'alcool, l'aspirine et certains médicaments pris en excès peuvent provoquer une irritation gastro-intestinale provoquant un saignement occulte. Ces substances doivent être arrêtées au moins 48 heures avant le test.
- Aucune restriction alimentaire n'est nécessaire

- ✓ Recueillir les selles dans le pot.
- ✓ Au minimum, un volume correspondant à **une grosses noix de selles** est nécessaire.
- ✓ **Après recueil de chaque selle**, le patient doit rapporter le jour même rapidement dans les 2 heures à température ambiante le pot au laboratoire pour que celui-ci soit traité dans les plus brefs délais ou **dans les 12 heures** si conservée au **réfrigérateur**.

Note : le flacon sera identifié par vos soins au laboratoire, à l'aide des étiquettes fournies après création du dossier informatique.